

Chapitre 6 : Applications

Des fonctions dont on connaît la forme algébrique

 **Exercice 1 :** Étudier l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité des applications suivantes. Lorsqu'elles sont bijectives, déterminer les applications réciproques.

$$1. f : \begin{cases} \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sqrt{x} \end{cases}$$

$$2. f : \begin{cases} \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x \mapsto \sqrt{x} \end{cases}$$

$$3. f : \begin{cases} \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ x \mapsto x + 1 \end{cases}$$

$$4. f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x + 1 \end{cases}$$

$$5. f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto |x| \end{cases}$$

$$6. f : \begin{cases} \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto |x| \end{cases}$$

$$7. f : \begin{cases} [-1, 1] \rightarrow [0, 1] \\ x \mapsto |x| \end{cases}$$

$$8. f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^3 \end{cases}$$

$$9. f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^4 \end{cases}$$

$$10. f : \begin{cases} \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^4 \end{cases}$$

$$11. f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^5 \end{cases}$$

$$12. f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^n, n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

$$13. f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow]1, +\infty[\\ x \mapsto e^{-x} + 1 \end{cases}$$

$$14. f : \begin{cases}]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \ln(1+x) \end{cases}$$

$$15. f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow]-4, +\infty[\\ x \mapsto 2^x - 4 \end{cases}$$

$$16. f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow [-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \\ x \mapsto \cos(x) + \sin(x) \end{cases}$$

$$17. f : \begin{cases} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \\ n \mapsto 2n + 1 \end{cases}$$

 **Exercice 2 :** Soit f définie par $f(x) = \frac{x^2}{1-x}$.

1. Étudier la fonction f . On note \mathcal{D}_f son domaine de définition.
2. f est-elle injective de \mathcal{D}_f dans \mathbb{R} ? Surjective de \mathcal{D}_f dans \mathbb{R} ?
3. Montrer que la restriction $g : [2, +\infty[\rightarrow [-\infty, -4]$ est une bijection.

 **Exercice 3 :** On définit la fonction sinus hyperbolique, notée sh , par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

1. Montrer que sh est une bijection de \mathbb{R} vers un ensemble à déterminer.
2. Calculer sa bijection réciproque, notée argsh .

 **Exercice 4 :** Montrer que l'application $f : z \mapsto \frac{z+i}{z-i}$ est une bijection de $\mathbb{C} \setminus \{i\}$ sur un sous ensemble à déterminer. Donner la bijection réciproque.

 **Exercice 5 :** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \max\left(\frac{x+5}{10}, x-3\right)$. L'application f est-elle injective? Surjective? Bijective? Si oui, déterminer son application réciproque.

 **Exercice 6 :** Soit $E = \{0, 1\}^2$. On définit f et g par

$$f : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, x_2) \mapsto x_1 + x_2 \end{cases} \quad \text{et} \quad g : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow E \\ x \mapsto \begin{cases} (1, 1) & \text{si } x > 1 \\ (0, 1) & \text{si } x = 1 \\ (0, 0) & \text{si } x < 1. \end{cases} \end{cases}$$

1. Les fonctions f et g sont-elles injectives, surjectives?
2. Déterminer $f \circ g$ puis $g \circ f$.

 **Exercice 7 :** Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \mapsto (x+y, x-y) \end{cases}$.

Montrer que f est bijective de \mathbb{R}^2 dans \mathbb{R}^2 et déterminer sa réciproque.

De manière plus abstraite

 **Exercice 8 :** Soit E , F et G trois ensembles. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.

- Montrer que si $g \circ f$ est injective et f surjective alors g est injective.
- Montrer que si $g \circ f$ est surjective et g injective alors f est surjective.

 **Exercice 9 :** Soit E , F et G trois ensembles. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : E \rightarrow G$ deux applications. On considère l'application h définie par

$$\begin{aligned} h : \quad E &\rightarrow F \times G \\ x &\mapsto (f(x), g(x)). \end{aligned}$$

- Montrer que si f ou g est injective de E dans F ou de E dans G alors h est injective de E dans $F \times G$.
- On suppose que f est surjective de E dans F et que g est surjective de E dans G . L'application h est-elle nécessairement surjective de E dans $F \times G$?

 **Exercice 10 :** Soit E , F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application.

- Montrer que : pour tous A et B , sous-ensembles de E , $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$. Conjecturer une condition nécessaire pour que l'égalité soit vérifiée, pour tous A et B .
- Démontrer que cette condition est également suffisante.

 **Exercice 11 :** Soit E un ensemble et $f : E \rightarrow E$ une application telle que $f \circ f \circ f = f$. Montrer que f est injective si et seulement si f est surjective.

Images directes

 **Exercice 12 :** On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $x \mapsto x^3 - 3x$.

- Étudier les variations de f .
- f est-elle injective de \mathbb{R} dans \mathbb{R} ?
- Déterminer $f([1, 2])$, $f(\mathbb{R})$, $f([-1, +\infty[)$.

 **Exercice 13 :**

- Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction carrée. Déterminer $f([-1, 2])$.
- Déterminer $\sin\left(\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]\right)$, $\tan\left(\left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right[\right)$ et $\cos\left(\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}\right]\right)$.

 **Exercice 14 :** Soit f l'application de \mathbb{C} dans \mathbb{R} qui, à tout complexe associe son module. Dans chacun des deux cas suivants, déterminer l'image directe de A par f .

- $A = \{z \in \mathbb{C}, \exists x \in \mathbb{R}, z = x + 2i\}$.
- $A = \{z \in \mathbb{C}, \exists x \in \mathbb{R}, z = (1 + \cos(x)) + i \sin(x)\}$.